新刻萬氏家傳廣嗣紀要卷之三

羅田萬全著
黄岡門人蔡朝衣校
閩中書林余良史梓

陰陽別論曰陰搏陽別謂之有子王太僕云陽謂尺中也搏謂搏觸於手也尺脉搏擊與寸口脉別則為娠子之兆何者陰中有別陽也

○轉女為男法

良方論曰陽施陰受所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠三月名曰始胎血脉不流形象而變是知男女未定故令於滿三月間

服藥方術轉令生男也其法以斧置姙娠床下繫刃向下勿令人知恐不信者待鷄抱卵時依此置窠下一窠盡出雄鷄子
又初覺有姙取弓弩絃縛婦人腰下滿百日去之紫宮玉女秘法也又如三月已前取雄鷄尾尖上毛三莖潜安婦人卧席下勿令知之驗又取夫髮及手指甲潜安卧席下勿令人知之
又姙娠纔及三月要男者以雄黄半兩衣中帶之要生女者取雌黄帶之有驗

寓意云夫婦媾精陰陽分形陽精勝者為男陰血勝者為女固已別矣豈能轉移之耶雖三月男女分形陽精勝者為男陰血勝者為女蓋一月二月之間精血混合男女之形未彰至於三月陰陽始判震巽之索斯定故曰男女分也謂初受之氣於茲始定非謂陰

陽男女初無定體必待三月而後分故可以轉移变化之耳古人
留是法者必有所試陰陽变化之妙愚不得而知焉

○護養胎元

脉経曰婦人懐一月之時足厥陰脉養二月足少陽脉養三月手心主脉養四月手少陽脉養五月足太陰脉養六月足陽明脉養七月手太陰脉養八月手陽明脉養九月足少陰脉養十月足太陽脉養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上為乳汁活兒養母懐胎者不可灸刺其經必堕胎

按巣氏病源論云婦人妊娠一月名胎胚足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎手心主脉養之四月始受水精以

成血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足太陰脉養之六月始受木精以成其筋足陽明脉養之七月始受金精以成其骨手太陰脉養之八月始受土精以成膚革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十月五臓六腑関節人身皆備此足太陽脉養之也

良方論云四時之令必始於春木故十二經之養始於肝也若足厥陰肝脉也足少陽膽脉也所以養胎在一月二月也手心主心包絡脉也手少陽三焦脉属火而夏旺所以養胎在三月四月足太陰脾脉也足陽明胃脉属土而旺長夏所以養胎在五月六月也手太陰肺脉也手陽明大腸脉也属金而旺秋所以養胎在七月八月也足少陰腎脉也属水而旺冬所以養胎在九月况母之腎臓

繋於胎是母之真氣子之所賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脉所養然後待時而生此論奥妙而有至理餘書所論皆不及也

良方論云然則胚胎造化之始精移氣变之後保衛輔翼固有道矣天有五氣各有所湊地有五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌悉知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出入以節可以高明可以周密霧露風邪不得投間而入因時為養者理固然也以致調喜怒寡嗜慾不妄作勞而氣血從之皆所以保攝妊娠使諸邪不得干焉苟為不然方授受之時一失調養則内不足以為中之守外不足以為身之强氣形弗充而疾病因之若食免脣缺食犬無聲食雜魚而瘡癬之属皆以食物不戒之過也心

氣大驚而顛疾腎氣不足而解顱脾胃不和而羸瘦心氣虛乏而神不足之屬皆以氣血不調之過也誠能食飲知所戒推而達之邪氣無所乘茲乃生育相待而成者故曰天非人不因

○食物所忌

食犬肉令子無聲音○食兎肉令子缺唇○鷄肉合糯米同食令子生寸白虫○鱠鯉同鷄子食令子生瘄多瘡○食羊肝令子多厄難○食鱉魚令子項短○鴨子與桑椹同食令到生心寒○鱔魚同田鷄食令子瘖瘂○雀肉合豆醬同食令子面生黒子○食螃蠏横生○食子姜令子多指生瘡○食冰醬令絶産○食雀肉飲酒令子多淫無恥○食茨菰消胎氣○乾姜蒜毒胎無益粘膩難化傷胎○食驢馬肉過月難産○豆醬合藿同食墮胎○食山羊

肉子多病○無鱗魚不可食鱼有大毒有食者誕子多風而夭
食雀腦令子雀目
婦人有娠最不可針灸及乱服藥餌恐致墮胎以貽后悔
驗胎法大凡婦人三月經不行宜用川芎一兩為末濃煎入八分入
○一盞空心調服之服盡覺胸中微痛則有胎矣不動者血病也
若動在臍下者血瘕也故脉經云一月血為閉二月若有若無三
月為血積也

○胎前所忌藥物歌

蚖斑水蛭地膽蟲　烏頭附子配天雄
躑躅野葛螻蛄類　草烏側子與虻蟲

牛黃水銀并巴豆　大戟蛇蛻及蜈蚣
牛膝藜蘆加薏苡　金石錫粉對雌雄
牙硝芒硝牡丹桂　蜥蜴　生與䗪虫
代赭蚱蟬胡腦射　芫花薇蘅草三稜
槐子牽牛并皂角　桃仁蠐螬及茅根
欓根硇砂與乾漆　亭長溲疏茵草中
瞿麥閭茹蟹爪甲　蝟皮鬼箭赤頭紅
馬刀石蠶衣魚等　半夏南星通草同
乾薑蒜雞并鴨子　驢馬兔肉不須供
切忌婦人產前用　此歌宜記在心胸

歌中半夏炒過乾薑炮過可用不必拘疑

妊娠所忌切不可犯犯則損胎子母不利詳見下文婦人受胎之後常宜行動使氣血流通百脉和暢臨産無難也今之為婦者好逸悪労喜静懶動含哺養嬌以致氣血不行産育多苦况行住坐臥之久為皮肉筋骨之傷子在腹中氣通於母母氣既傷子亦受病又勿登高勿越險勿舉動恐致墮胎婦人胚胎常欲見美事聞善言若彼神怪之像傀儡之類必遠避之勿令見也稍有犯者児必肖之其貌不雅居處之處欲其得軒豁明朗切忌僻静幽暗無人相伴恐其胎氣怯弱邪氣侵犯為害甚大

仁齋云婦人懐胎臓氣擁閉不可多睡不可憂懼労役不可啖食粘滞辛辣堅硬之物又不可妄施針灸所貴時行数歩調暢自適使氣得其平若酒麪炙煿熱毒葷㷻若感觸風邪傳染熱氣若誤服

藥餌破血動胎若七情內傷快意縱慾則易致漏胎若近產多淫觸犯胎氣則易墮落也

良方云受胎之後切宜避胎殺所遊之方

正月房床　二月戶扇　三月門　四月竈
五月母身　六月床　七月碓磨　八月廁
九月門　十月房　十一月爐竈　十二月房床

○六甲胎神

甲己日占門　乙庚日碓磨　丙辛日廚竈　丁壬日倉庫
戊癸日房床

○十二支胎神

子午日碓　丑未日占廁　寅申日占爐　卯酉日大門

辰戌日鷄栖　巳亥日上牀

○調理胎疾

仁齋安胎之法有二或因母疾以致動胎者但療母病其胎自安或胎氣不堅因觸動以致母病者則安胎而母自愈以膠艾湯當歸湯各半縮砂佐之為良

丹溪云天行不息所以生生而無窮產前當清熱養血為主

茺蔚子活血行氣有補陰之功命名益母以其行中有補也故曰產前無滯產後無虛

黃芩乃安胎之聖藥俗以為寒而不敢用反用溫熱藥謂能養脾殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎必擇條

實者用之
縮砂安胎以止其痛行氣故也非八九箇月不可多用
金匱要畧云婦人姙娠常服當歸散主之
當歸　川芎　白芍各一两　白朮半两　條芩乙两
或散或酒糊丸或湯

○姙娠墮胎

丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虛乏不足以榮養其胎則墮譬如枝枯則菓落藤萎則花墜又有勞怒傷精內火便動亦能墮胎譬如風撼其木人折其枝也火能消物造化自然病源所謂風冷傷子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有娠至三箇月必墮

診其脉左手大而無力重則濇知其血少也以其壯年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黄芩末一錢與数十貼得保全而生因而思之曰於内熱而虚者於理為多曰熱曰虚盖孕至三月正属相火所以易堕不然何以黄芩熟地黄阿膠等為安胎妙薬耶

王節齋云婦人堕胎多在三五箇月七箇月而堕者除跌撲損傷○不拘外若前次三箇月而堕則下次必如期復然盖先於此時受傷故後於至期必應乗其虚也遇有半産者後須多服養氣血固胎元之藥以補其虚損下次有胎先於兩箇半月後即服固胎藥十数貼以防三月之堕至四箇半月後再服八九貼防過五月又至六箇半月後再服五七劑以防七月及至九箇月内服丹溪達

生散数十貼可保無虞其連墮数次胎元損甚者服藥須多久則可以留方用四物湯倍加人參白朮阿膠陳皮茯苓甘草艾葉條芩氣加香附縮砂痰加姜製半夏調理

丹溪固胎飲　常墮胎者宜服之

熟黄五分　歸身　人參　白芍各壹錢　白朮錢半
川芎五分　陳皮壹錢　條芩五分　甘草三分　黄連少許
黄蘗少許　桑木上羊兒藤七葉圓者即桑絡也真寄尤妙

水二盞糯米五七十粒煎服血加阿膠胎氣痛加縮砂

癸山云孕而多墮者男子貪淫情縱女子好慾性偏兼以好食辛酸熱物暴損衝任故有墮胎之患其膏粱與藜藿婦人不同慾之多寡故也有二等婦人有胎似乎無胎痰氣疼痛發熱醫者不明脉

理妄施耗氣退熱之劑不知胎氣宜養病氣宜攻若有胎反用攻藥豈不誤矣故養胎者血也護胎者氣也或有婦人小産太多及至中年設法服藥保全但慾心未絶其性情不改百凡上氣逆損衝任因而殞命者有之故昔人有言飛禽抱卵走獸懐胎物類尚能保全育人為萬物之靈反不及此何耶且小産甚於大産瓜菓生而摘之豈不傷其枝蔓養生可不慎哉

又或問予曰今婦人小産最多往往服藥保孕鮮有效者何也予答曰婦人縱慾恣餐口体傷於衝任故有墮胎之患醫家不審氣血冷熱妄施歸芎膠艾香燥之藥因而墮者有之求為則例者亦有之世俗槩用濟生寶艾附等丸以為的當殊不知前品乃濕熱之藥助火消陰之劑血熱妄行故漏胎之患必有且如果品多生春

夏少結秋冬既因血漏胎又為寒治必致誤人子特為此叅出一方藥品雖少其功甚大但懷胎特自知慎重避忌服此藥可以保全遂名曰千金保孕丸

杜仲八両去粗皮以糯米煎湯拌勻炒断絲 煙塵續断三両去蘆

右二味為細末以山藥五両作糊為丸如桐子大每服七十丸空心米飲下忌酒醋戒惱怒一方用棗肉為丸

又云墮胎氣血不足氣不足胎無所榮血不足胎無所養榮養失宜猶木枯菓落其間過傷怒氣勞佚動胎内外冷熱傷於子臟又當量輕重而治之

胎産須知云胎氣不固常小産用四物湯加炒阿膠炒黒香附白朮黄芩砂仁糯米煎服

家寳預防墮胎之方莫有善於所集者惟金匱當歸散方去川芎用熟地黄加阿膠炙甘草若常服之尤穏更兼安胎丸一名湖蓮丸

蓮肉去心二两　白朮二两　條芩二两　砂仁一两半炒

共為末山藥五两糊為丸如梧桐子大毎五十米飲下

○姙娠漏胎

要畧師曰婦人有漏下者有半産後間續都不絶者有姙娠下血者假令姙娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

芎藭　阿膠　甘草各壹銭　艾葉　當歸各銭半

白芍　熟黄各二銭

水二盞酒一盞煎一盞去滓内阿膠慢火煎令膠烊頓服之

丹溪云有娠而血漏下也屬氣虚血熱可服固孕之藥方見前胎産須知條

河間二黄散　治胎漏下血

生　熟地黄　等分

右為末煎白朮枳殻湯下貳錢或錢半

劉宗厚按良方論云婦人有子之後血畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有孕而月信每至是亦未必因血盛也若謂榮血有風則經血始動以其風勝則有此例可見胎漏之因非止一端也治者宜擴充焉

如血熱胎漏者用丹溪漏下血方

條芩伍錢　白朮壹両　砂仁炒　阿膠蛤粉炒成珠各三錢

右為末毎服二錢艾葉湯下

氣血兩虛下血不止者秘傳當歸寄生湯

當歸　川芎　艾葉　白朮各壹錢　人參　寄生

川續断　熟地黄各貳錢　水煎服

良方論妊娠婦全假血以養胎或因驚走或從高墜下冒涉風邪觸忤神祟以致下血胎奔上心腹中急動或血從口出皆是傷胎其下血不止胎上衝心四肢厥冷悶絶將死者

阿膠炒　艾各二両　青竹茹拳大　白蜜二合

右水六升煮艾竹茹至二升去滓入膠蜜二一沸待膠烊分作三服

妊血如月信者名至胞乾非特損子亦損母矣

芎藭　乾姜炮各半両　右為細末酒調服三錢日夜分三服

立聖散　治妊娠下血不止用鷄肝二具以好酒一升煮熟共酒

按朝字上或脫一字乎

食大效

家寶云女子之血在下為經水在上為乳汁朝有娠則經水不動乳汁不行聚於子宮以養其胎也故胎之有血如魚之有水水深則魚滑活水涸則魚困矣今有娠而復下血乃氣虛血虛胞中有熱不固止之但恐血枯子命難全母亦隨斃法當用人參白朮以補其氣歸芎以補其血黄芩以清其熱生甘草以瀉其火阿膠以止其血未有不安者矣

○胎動不安

丹溪云胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類夫黄芩安胎之聖藥而安胎飲胎成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間

作痰或飲食不美宜服或五六個月常服甚好此乃丹溪方也

白朮　當歸　白芍　熟地黄各壹錢　人參　川芎

條芩　陳皮　甘草　砂仁　蘇葉各叁分

生姜三片水煎服

密齋云　胎動不安其因有七或因墜跌舉重觸動胎氣者或因縱欲無度觸動胎氣者或因七情失節觸動胎氣者或因誤食辛熱觸動胎氣者或因觸冒寒暑衝動胎氣者或因修造移徙觸犯胎氣者或因母多疾病胎失其養而不安者當各察之勿妄治也

如因自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血宜用安胎散主之

砂

縮砂不拘多少和皮略炒勿令焦黒去皮取仁為末以當歸川

芎等分水煎作湯調服如覺胎中熱其胎即安矣此方大驗○

大抵姙婦不可缺血常服之則安胎易産

如因夫婦貪歡不知避忌縱恣情慾以致衝任傷損觸動胎元胎動腹疼或為漏胎者宜如聖散主之

鯉魚皮 鮮者　當歸　熟地黄　阿膠 麺炒為珠　白芍

川續断　川芎　炙草 各等分

水一盞苧根少許姜三片煎服立安

如因喜怒憂思恐懼失節觸動胎氣不安者宜加减四物天香湯主之

當歸　川芎　香附　陳皮　蘇葉

因於怒加黄芩甘草人参以緩其中使肝氣平

因於憂者加枳殼大腹皮以理其氣使脾氣平飲食進

因於喜者加黃芩黃連麥門冬以瀉其火使氣平

因於恐者加茯神益智以安其神使腎氣平則胎自安矣

如因恣食酒麵炙煿厚味及誤服辛熱毒藥者以致邪火薰蒸胎動

不安宜加味枳殼湯主之

枳殼半両　黃芩壹両　白朮壹両　加黃連　黃蘗各二錢炒

生甘草　青竹茹　水煎服三錢一劑

如因起居不時衝寒冒暑動其胎者宜金匱當歸散加減

因寒加葱白蘇葉生姜　因暑加黃連人參知母

如因修方動土移徙堆垛觸犯日月胎神以致不安者宜服前安胎

散更請道高者於神所占之方作符使禳之

如因母疾病氣衰血少不能護養其胎以致不安者宜十聖散主之

按身重當作重身

又按愈痛之痛當作癥

又按必死之死當作廼字

即十全大補加减也

人參　白朮　地黄　砂仁炒　黄耆各五分　炙草

川芎　歸身　白芍炒各一錢　川續断八分　水煎服

右已上胎動不安者諸症如有腹痛下血者各就本方加阿膠艾葉

○姙娠積聚附鬼胎　凡七論三方

六元正紀太論帝曰婦人身重毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也王太僕云故有堅大癥瘕痛甚不堪則治以破積愈痛之藥是謂不救必死盡死救之蓋存其大也雖服毒不死也上無殞言毋必全下無殞言子亦不死也

又曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

按苓字下脱一茯字

河間云藥之性味本以治疾誠能處以中庸與疾適當且如半而止之亦何疑於攻治哉

要略云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍者為癥痼害妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月下血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓主之

桂枝　茯苓　丹皮　桃仁去皮尖炒　芍藥各等分

右五味為細末煉蜜丸如兎屎大每日食前服一丸不止加至三丸温水下

脉經云設令宮中人若寡婦無夫曾夜夢寐交通邪氣或懐作久癥瘕急當治下

斬鬼丹　治婦人鬼胎如抱甕

呉茱萸　川烏頭　白殭蚕炒　秦艽　柴胡

巴戟去心　巴豆油不去　芫花各一両

右為末蜜丸梧桐子大毎服七丸蜜酒吞取去悪物即愈

寸口脉洪而濇洪則為氣濇則為血氣動丹田其形即温濇在于下

胎冷若氷陽氣胎活陰氣必終欲別陰陽其下必殭假令陽終畜

然若杯陰為死胎陽為畜血

問婦人雙胎其一獨死其一獨生醫其生下其死者其病則愈然後

竟免軀何脉以別之師曰寸口脉衞氣平和榮氣緩舒陽施陰化

精盛有餘陰陽俱盛故知雙胎今以陰微緊血則濁凝經養不周

胎則偏夭少腹冷滿膝臏疼痛腰重起難此為血理若不早去害

毎失胎　宜芎帰湯

芎藭　當歸各等分　每服三五錢加蘇葉數莖酒水合煎死者
即下未者即安

○妊娠惡阻　凡三論五方二案

惡阻者謂有娠而惡心阻其飲食也按内經精化于氣氣傷於味註云精肉内結鬱爲穢腐攻胃則五味居然不得入也女人重身精化百日皆傷于味也其斯惡阻之謂歟

妊娠平日喜怒憂思七情氣滯以致中脘伏痰留飲有娠之後經血既閉飲血相搏氣不宣通遂使心下憒悶頭旋眼花四肢倦怠惡聞食氣喜啖鹹酸多卧少起甚則吐逆不自勝持治療之法順氣理痰自然安矣○肥人是痰瘦人是熱

寇齋云妊娠惡阻者乃懷孕之常病不須服藥惟平日脾胃虛弱飲食少者心嘔吐太甚飲食不入者恐傷胃氣有害胎元必須治之然治此者必用半夏半夏有動胎之性必須製用炒過無妨

如肥人惡阻旋復花湯主之

旋復花　川芎　細辛減半　人參各壹錢　白茯苓

半夏　歸身　陳皮各貳錢　乾姜炮五分　炙草壹錢

已上十味分作二貼姜五片水煎服

又方加味二陳湯一名小茯苓湯

陳皮　白茯半各四錢　半夏三錢　白朮二錢四分　炙草壹錢

右㕮咀分作二服水二盞姜五片烏梅一個煎至八分服

瘦人惡阻宜人參橘皮湯主之一名竹茹湯〇一名參補飲

橘皮　茯苓各二錢　人参　麥冬　白术　厚朴姜製

炙草各壹錢　竹茹　鷄子大一團　水碗半姜五片煎服　○又方白术

二両條芩一両砂仁炒五錢為末神麴糊丸白湯下

如嘔吐不已者恐傷胃氣宜錢氏異攻散加藿香主之

白术　陳皮　茯苓各一錢　藿香葉　人参　砂仁各半錢

炙草一分　水盞半姜五片煎服或神麴為丸服尤妙

一婦孕両月嘔吐頭眩醫以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦左為甚此悪阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯抑青丸二十四丸五服稍安脉畧弦口苦乾食即口酸噫其膈間滞氣未盡行以川芎陳皮梔子生姜茯苓煎湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易饑此肝氣未平以熱

按食入之下脫反出二字

湯下抑青丸愈後兩手脉平和而右甚弱此時肝氣既平可用參
朮以防之服一月而胎不墮此丹溪治例也
徽州商人吳儼妻汪氏年三十餘末子二歲正食乳經水未行一日
因與夫爭言激怒得嘔逆病食入養胃之藥不效請予治之其脉
左三部沉实搏手右三部脉平予曰此有孕脉也當生二男汪曰
我生過三子皆三歲而後娠今小兒方二歲經又未動不是娠也
只因與我官人相罵便有此病予曰身有娠且不知之况醫人乎
宜其服藥而不效盖怒傷肝肝傳心諸臭皆屬於心心傳脾故隨
所食之物即作其物氣出也嘔逆食臭皆肝心二臟之火炎上之
象也以黃芩一兩黃連白朮陳皮香附童便炒黑白茯各五錢砂
仁炒二錢共為末神麯糊丸菉豆大每五十丸白湯下未五日而安

後果生雙男

○妊娠子懸 凡五論二方一按

妊娠五六箇月以後胎氣不和上湊心腹脹滿疼痛者謂之子懸嚴氏紫蘇飲主之

蘇葉 大腹皮 陳皮 川芎 白芍 當歸各六分
人參 甘草各三分

姜三片葱五莖水煎空心服亦治七情過傷胎動不安之病

蔡元度寵人有孕夫人怒欲逐之遂成此疾醫官王師復處香朮散用莪朮煨二錢丁香一錢甘草三分共為細末分作三服空心鹽湯調覺胸中如物推下之狀而愈

古菴云婦人忿怒憂思過度以致腹胸之間氣刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物忤不能自决而憂思忿怒沉欝于中丹溪云氣欝成火火載胎下榮衛不通則心腹之間脹滿痛疼俱作也宜矣

妊娠子上衝心昏悶刺巨闕穴在鳩尾下一寸是下針令甦不悶次補合谷瀉三陰交胎應針而落如子手掬心生下子有針痕頂母心向前人中有針痕向後枕骨有針痕是

辨云按十四経發揮云凡人心下有膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍著脊所遮膈濁氣不使上薰心肺是心在膈上也妊娠之婦若子上衝至膈則児之在腹指未能執物尚堅握而不伸者又有胞衣裹之豈能破膈握心哉心為一身之主神明出焉不容小有

所祀豈有被衝搦而不死哉蓋以其上衝近心故云亦如胃脘痛曰心痛之類是也學者不可以辭害意

家蔵云五臓系皆通於心而心通五臓系也故胞門子戸上通心系胎氣和則安靜而不動胎氣不和則伸縮轉動牽拽其系而心痛也如物懸墜之状名曰子懸

○姙娠子煩 凡七論九方

姙娠四月六月多苦煩悶蓋四月属少陰君火以養精六月属少陽相火以養氣所以如是又有不在此兩月分而苦煩悶者由將息失宜七情傷感而然也名曰子煩

家蔵云子煩之症皆属於熱有虚有實更宜分十二經養胎之月各

隨其臟氣治之此吾家傳之秘方也諸書未載也
如姙娠食少氣弱者此虛煩也宜麥門冬散主之
麥冬　白茯　防風各一分　人參半錢
水一盞姜三片淡竹葉十片煎七分服
姙婦氣実體壮者此實煩也宜竹葉湯主之
白茯　防風　麥冬　條苓　知母各一
淡竹葉十片煎服
如初受胎一月二月此足厥陰肝少陽膽二經之脉所養也此時精
混合胞胎融結肝胆氣逆使人頭悶不安嘔吐悪阻柴胡湯主之
柴胡一錢半　赤茯　麥冬　條苓各一錢　人參　橘皮
甘草各伍分　水盞半生姜三片煎八分溫服

妊娠三月四月手心主包絡少陽三焦三經之脉所養二經皆屬相火其氣逆令人煩悶不安口乾舌燥加味竹瀝湯主之

淡竹瀝一合　黄芩　麥冬　知母各壹錢　白茯錢半

右㕮咀水二盞入炒黄蘗三分煎二盞入竹瀝再煎一二沸服

妊娠五六月此時屬足太陰脾陽明胃經之脉所養若因飲食勞倦所傷以致氣逆令人腹脹煩悶不安者和胎飲主之

白朮　白茯　條芩各一錢　厚朴製　麥冬　枳殼炒各五分

甘草二分　水煎食遠服

妊娠婦七月八月此時受手太陰肺陽明大腸二經之養所養若因形寒飲令所傷以致氣逆令人喘咳煩悶不安者知母飲主之

白茯　黄芩各二錢半　知母　麥冬　炙草各壹錢六分

桑白皮　地骨皮各壹錢　分二貼水二盞煎一盞入竹
瀝一合再煎沸服

如妊婦九月屬足少陰腎經脉養此時胎形倶足如有煩悶不安者
乃胎肥作熱也宜芩朮枳殻湯主之

條芩錢半　白朮　枳殻炒各壹錢　生甘草五分

淡竹瀝十二片煎空心服

○妊娠子滿　凡二論一方一案

娠婦至七八個月此時受足太陰脾經手太陰肺經之氣已足形體倶成毛髮漸生其婦奉養本厚安居太過胎元肥壯濕熱內甚腹大如鼓腹滿下墜逼迫子戸坐卧不安謂之子滿經云諸濕腫滿

皆屬脾土諸氣膹鬱皆屬于肺宜東垣和氣飲主之

白朮　黄芩各銭半　大腹皮　枳殻炒各壹銭　蘇葉莖

砂仁各五分炒　炙草三分　水煎服

孫太和之妻娠八月得子滿病他醫作子懸治不效腹滿轉甚胎墜下迫玉門大張胞形外露但仰臥不能坐勢危請案齋師治之診其脉兩手倶大堅搏手謂其夫曰令正病無害乃雙胎也胎肥氣弱不能束約故下墜耳用束胎和氣主之加入參一銭升麻炒三分服三劑胎復上而安後生一男一女

要畧云婦人懐娠六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛悪寒者小腹如扇所以然者子臓開故也當以附子湯温其臓上

○姙娠子腫

一名子氣凡三論五方二案

戴云子腫者謂夫人手足或頭面通浮腫者是也
濟生方云曾有妊婦腹脹小便不利吐逆諸医雑進温胃寛氣等薬服之反吐轉加脹満湊心診之胎死也久服下死胎薬不能通併因得鯉魚湯其論曰妊娠遍身腫満或心胸急脹名曰胎水遂去婦人胸前看之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下悪水腫消脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此症盖懐娠腹大不自知覺人人皆謂胎娠如此終不知胎水之患也故著此以諭後人當首省察

三因鯉魚湯　専治妊娠腹脹胎有水氣

白朮五両　白芍　當帰各三両　白茯苓四両

右剉細鯉魚一個不拘大小破洗鱗腸白水煮熟取汁去魚不用

每服四錢魚汁一鍾半姜七片橘皮少許同煮七分空心服以胎水去盡為度一方加人參澤瀉

丹溪治一婦人三十八歲患有娠水腫鯉魚湯加五苓散治之愈

要畧云姙娠有水氣身重小便不利洒淅悪寒起即頭眩宜葵子茯苓散主之

葵子一升　茯苓三兩　右二味杵為末米飲服一錢日三服小便利為度

娠婦面目虚浮肢體腫如水氣者全生白术散主之

白术一錢　生姜皮　大腹皮　白茯皮　陳皮

桑白皮各伍錢

右㕮咀濃磨木香水半盞同煎八分去滓温服

如妊娠婦三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以来行歩艱辛状似水氣至於脚指間有黄水出又名子氣天仙藤散主之

天仙藤 即青木香苗莖也洗畧炒　香附 炒　陳皮　甘草 减半　烏藥 各等分　木瓜 三片　木香 等分

水盞半姜三片煎服

容齋云姙娠七八月後兩脚腫者未可醫治至産後其腫自消如兩脚腫甚者宜白术茯苓主之

白术　白茯 各二両　防已　木瓜 各三両

右為細末毎服一錢食前沸湯調下日三服腫消止藥